

## Notice : information du patient

### Mediaven forte 30 mg comprimés pelliculés (Naftazone)

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après un mois.

#### Contenu de cette notice

1. Qu'est-ce que Mediaven forte 30 mg comprimés pelliculés et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Mediaven forte 30 mg comprimés pelliculés ?
3. Comment prendre Mediaven forte 30 mg comprimés pelliculés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Mediaven forte 30 mg comprimés pelliculés ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### 1. Qu'est-ce que Mediaven forte 30 mg comprimés pelliculés et dans quel cas est-il utilisé ?

Groupe pharmacothérapeutique

Mediaven forte est un médicament contre l'insuffisance des veines.

Il contient de la naftazone qui augmente le tonus des veines.

Indications thérapeutiques :

On peut utiliser Mediaven forte en cas d'insuffisance des veines des jambes.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après un mois.

#### 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Mediaven forte 30 mg comprimés pelliculés ?

##### Ne prenez jamais Mediaven forte

- Si vous êtes allergique à la naftazone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Pendant les trois premiers mois de la grossesse.
- Pendant la période d'allaitement.

##### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Mediaven forte :

- Si vous souffrez d'un mauvais fonctionnement du foie ou des reins, demandez conseil à votre médecin avant de prendre des médicaments.
- Une bonne hygiène de vie est la base du traitement des troubles de la circulation veineuse.

- Ne prenez pas ce médicament pendant plus de trois mois sans consulter votre médecin.
- Si vous prenez d'autres médicaments, veuillez lire également la rubrique « Prise de Mediaven Forte en association avec d'autres médicaments ».

Veillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d'application pour vous, ou si elle l'a été dans le passé.

**Enfants et adolescents :**

En l'absence d'études de sécurité suffisantes, l'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.

**Autres médicaments et Mediaven forte**

Il n'y a pas, à ce jour, d'interaction connue entre le Mediaven forte et d'autres médicaments.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez pris récemment ou pourriez prendre tout autre médicament.

**Mediaven forte avec des aliments et des boissons :**

Pas d'interaction connue à ce jour.

**Grossesse et allaitement**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

**Grossesse :**

Mediaven forte ne sera utilisé pendant la grossesse que si le médecin le juge indispensable. Il faut en tout cas s'abstenir de l'utiliser pendant les trois premiers mois de la grossesse.

**Allaitement :**

Le passage de la naftazone dans le lait maternel n'étant pas connu, la prise de Mediaven forte est déconseillée pendant cette période.

**Conduite d'un véhicule et utilisation de machines**

Sans effet.

**3. Comment prendre Mediaven forte 30 mg comprimés pelliculés ?**

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre pharmacien en cas de doute.

Prenez les comprimés de Mediaven forte, avec un verre d'eau, au cours des repas.  
La dose recommandée est d'1 comprimé de Mediaven forte 30 mg, en milieu de journée.

Durée du traitement : un mois ou plus longtemps, selon les indications de votre médecin.

Voie d'administration : orale

**Si vous avez pris plus de Mediaven forte que vous n'auriez dû :**

Il n'y a aucune crainte à avoir en cas de prise exagérée accidentelle.

Si vous avez utilisé ou pris trop de Mediaven forte, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poison (070/245.245).

**Si vous oubliez de prendre Mediaven forte :**

Reprenez normalement le traitement.

**Si vous arrêtez de prendre Mediaven forte:**

L'arrêt du Mediaven forte n'entraîne pas d'inconvénient.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin, ou à votre pharmacien.

**4. Quels sont les effets indésirables éventuels**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Des manifestations allergiques, sous forme de prurit ou d'éruption cutanée, peuvent survenir.
- Des troubles digestifs sans gravité et qui disparaissent rapidement, ont rarement été signalés.
- Il est arrivé que les urines se colorent légèrement en orange-rouge (couleur du médicament), ce qui est sans danger.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration :

Belgique

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Division Vigilance

Avenue Galilée 5/03 1210 BRUXELLES	Boîte Postale 97 1000 BRUXELLES Madou
---------------------------------------	---

Site internet : [www.notifieruneffetindesirable.be](http://www.notifieruneffetindesirable.be)

e-mail: [adr@afmps.be](mailto:adr@afmps.be)

Luxembourg

Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy

Ou Division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la santé

Site internet : [www.guichet.lu/pharmacovigilance](http://www.guichet.lu/pharmacovigilance)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

**5. Comment conserver Mediaven forte 30 mg comprimés pelliculés ?**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après la mention « EXP : ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout, ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

**6. Contenu de l'emballage et autres informations**

**Ce que contient Mediaven forte**

- La substance active est : la naftazone. Un comprimé contient 30 mg de naftazone.

- Les autres composants (excipients) sont : Hydrogénophosphate de calcium anhydre – Cellulose microcristalline - Amidon de maïs prégélatinisé -Talc – Carboxyméthylamidon sodique– Stéarate de magnésium - Silice colloïdale anhydre - Enrobage : Hypromellose – Macrogol 6000.

**Aspect Mediaven forte et contenu de l’emballage extérieur**

Mediaven forte se présente sous formes de comprimés conditionnés dans des plaquettes (PVC-PE-PVDC/Alu) en boîtes de 30 et de 60 comprimés.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

**Titulaire de l’Autorisation de Mise sur le Marché et fabricant**

Titulaire de l’Autorisation de Mise sur le Marché

Belgique : Will-Pharma - rue du Manil 80 - B-1301 Wavre.

Luxembourg: Will-Pharma Luxembourg - rue du Merschgrund 54 - L-8373 Hobscheid.

Fabricant

Haupt Pharma Wülfing GmbH

Bethelner Landstrasse. 18

31028 Gronau / Leine

Allemagne

Et

Will-Pharma

Rue du Manil 80

B – 1301 Wavre

**Numéros des Autorisations de Mise sur le Marché :**

Belgique : BE235776

Luxembourg : 0489/02090028

**Mode de délivrance :**

Belgique : délivrance libre.

Luxembourg : délivrance libre.

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est : 24/11/2022.**

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : 11/2022.**