

NOTICE : INFORMATION DU PATIENT

Maalox Antacid® Sans Sucre Citron 200 mg/400 mg comprimés à croquer

Oxyde d'aluminium - Hydroxyde de magnésium

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Maalox Antacid et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Maalox Antacid
3. Comment utiliser Maalox Antacid
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Maalox Antacid
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE MAALOX ANTACID ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE

Maalox Antacid est un médicament à base d'hydroxyde d'aluminium (oxyde d'aluminium hydraté) et d'hydroxyde de magnésium.

Maalox Antacid est indiqué pour le traitement symptomatique de courte durée de l'**acidité gastrique** et des **douleurs gastriques**. Cela signifie que vous ne pouvez pas utiliser ce médicament pendant plus de 14 jours sans consulter un médecin. Il est également important d'arrêter le traitement dès que vos symptômes ont disparu.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER MAALOX ANTACID

N'utilisez jamais Maalox Antacid

- Si vous êtes allergique à l'oxyde d'aluminium, l'hydroxyde de magnésium ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous avez une atteinte sévère des reins.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Maalox Antacid.

- Si vous suivez un régime pauvre en phosphore, consultez d'abord votre médecin.
- Si vous présentez des douleurs osseuses, un malaise (état général d'inconfort, fatigue ou maladie) ou une faiblesse musculaire, **arrêtez le traitement et consultez votre médecin.**

- Si vous avez une altération de la fonction rénale. Certains troubles peuvent notamment survenir car le médicament s'accumule dans le sang.
- Si vous souffrez de troubles de la parole, de mouvements anormaux, de troubles intellectuels sévères, d'une chute de la tension artérielle, d'une somnolence, d'une diminution des réflexes ou de troubles au niveau du cœur ou de la respiration, **arrêtez le traitement et consultez votre médecin.**
- Si vous avez une atteinte des reins. Vous devez alors éviter l'utilisation prolongée de médicaments contre l'acidité gastrique (antiacides).
- L'hydroxyde d'aluminium peut être néfaste si vous souffrez de porphyrie (une maladie causée par un trouble de la fabrication du pigment rouge du sang) et si vous subissez une hémodialyse (une thérapie de remplacement de la fonction rénale).

Enfants et adolescents

Maalox Antacid peut être utilisé par les adultes et enfants à partir de 12 ans. Chez les jeunes enfants, l'utilisation d'hydroxyde de magnésium peut provoquer une hypermagnésémie, en particulier s'ils présentent une insuffisance rénale ou une déshydratation.

Autres médicaments et Maalox Antacid

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre l'un des médicaments énumérés ci-dessous, car certains médicaments peuvent être affectés par Maalox Antacid ou ils peuvent affecter l'efficacité de Maalox Antacid.

En particulier :

- Médicaments utilisés pour traiter le cœur comme la digoxine, la quinidine, le métoprolol, l'aténolol et le propranolol
- Médicaments utilisés pour traiter l'anémie tels que les sels de fer
- Médicaments utilisés pour traiter les ulcères à l'estomac et l'acidité tels que la ranitidine ou la cimétidine (antagonistes de H2)
- Médicaments utilisés pour traiter le paludisme tels que la chloroquine
- Médicaments utilisés pour traiter certains troubles osseux tels que les bisphosphonates
- Médicaments utilisés pour traiter certaines réactions allergiques, inflammatoires ou immunitaires anormales telles que les glucocorticoïdes
- Médicaments utilisés pour traiter les troubles des reins tels que les citrates
- Médicaments utilisés pour traiter la tuberculose tels que l'éthambutol, l'isoniazide
- Médicaments utilisés pour traiter les infections telles que les fluoroquinolones, les lincosamides, le kétoconazole, cyclines, céphalosporines (cefopodoxime et cefdinir), dolutégravir, elvitégravir, raltégravir potassium et association de traitement antiviral de fumarate de ténofovir alafénamide/emtricitabine/bictégravir sodium, rilpivirine
- Médicaments utilisés pour traiter les maladies mentales (psychose) comme les phénothiazines, les neuroleptiques
- Médicaments utilisés pour traiter l'augmentation des quantités de potassium dans l'organisme, comme le polystyrène sulfonate
- Médicaments utilisés pour traiter la douleur tels que le diflunisal, l'indométacine
- Médicaments utilisés dans les soins dentaires tels que la fluorure de sodium
- Médicaments utilisés pour traiter une glande thyroïde hypoactive comme la lévothyroxine
- Médicaments utilisés pour traiter les douleurs articulaires et les réactions chimiques anormales dans l'organisme tels que la pénicillamine
- Médicaments utilisés pour réduire le cholestérol tels que la rosuvastatine
- Médicaments utilisés pour traiter le cancer tels que le nilotinib, le dasatinib monohydraté
- Médicaments utilisés pour traiter les troubles sanguins tels que l'eltrombopag olamine

- Médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle dans les poumons (hypertension pulmonaire) tels que le riociguat

Par précaution, échelonner les temps d'administration de tout médicament administré par voie orale et de l'antiacide d'au moins 2 heures (4 heures pour les fluoroquinolones).

Maalox Antacid avec des aliments, boissons et de l'alcool

Évitez la prise simultanée d'alcool, de café ou de boissons contenant de l'acide citrique telles que les jus de fruits.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

- Ne prenez pas de doses élevées de Maalox Antacid pendant la grossesse.
- Ne prenez pas Maalox Antacid pendant plus de deux semaines pendant la grossesse.
- Consultez un médecin si vous souhaitez utiliser Maalox Antacid pendant plus de deux semaines pendant la grossesse.
- - Maalox Antacid ne doit être utilisé pendant la grossesse que si les avantages potentiels pour la mère l'emportent sur les risques potentiels, y compris ceux pour le fœtus.

Allaitement

- Les composés à base d'aluminium se retrouvent dans le lait maternel.
- Ne prenez pas de doses élevées de Maalox Antacid si vous allaitez.
- Ne prenez pas Maalox Antacid pendant plus de deux semaines pendant l'allaitement.
- On pense que la prise de magnésium est compatible avec l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Maalox Antacid n'a aucun effet sur l'appétit à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Maalox Antacid Sans Sucre Citron 200 mg/400 mg comprimés à croquer contiennent du maltitol (E965) et du sorbitol (E420).

Ces comprimés à croquer contiennent du maltitol. Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ces comprimés à croquer contiennent 157 mg de sorbitol par comprimé à croquer. Le sorbitol est une source de fructose. Si votre médecin vous a informé(e) que vous (ou votre enfant) présentiez une intolérance à certains sucres ou si vous avez été diagnostiqué(e) avec une intolérance héréditaire au fructose (IHF), un trouble génétique rare caractérisé par l'incapacité à décomposer le fructose, parlez-en à votre médecin avant que vous (ou votre enfant) ne preniez ou ne receviez ce médicament.

Ces comprimés à croquer sont « sans sucre » et donc conviennent si vous avez un diabète ou si vous suivez un régime hypoglycémiant (pour réguler les taux sanguins de sucre).

3. COMMENT UTILISER MAALOX ANTACID

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Voie et mode d'administration

Les comprimés sont destinés à être mâchés ou sucés.

La dose recommandée est :

- **Adultes et enfants à partir de 12 ans :**

1 à 2 comprimés par prise, 4 fois par jour. De préférence une heure après les 3 repas principaux et au coucher.

Si nécessaire, vous pouvez prendre une dose. Cette prise peut s'effectuer 2 heures après la prise précédente, avec un maximum de 7 prises par jour (ce qui correspond à 14 comprimés à croquer par jour).

Consultez votre médecin si les problèmes digestifs durent plus de **14 jours**.

Si vous avez utilisé plus de Maalox Antacid que vous n'auriez dû

En cas de prise prolongée de doses très élevées de ce médicament, les symptômes suivants peuvent survenir : tension artérielle faible (hypotension), somnolence, perte des réflexes au niveau des tendons, faiblesse musculaire, troubles respiratoires et du rythme cardiaque (troubles cardiorespiratoires), survenue progressive de troubles de la parole, troubles intellectuels sévères, mouvements anormaux, diarrhée, douleurs abdominales, vomissements.

L'aluminium et le magnésium sont excrétés par voie urinaire ; le traitement du surdosage aigu du magnésium comprend la réhydratation et la diurèse forcée. En cas d'insuffisance rénale, une hémodialyse ou une dialyse péritonéale est nécessaire.

Le gluconate de calcium peut être utilisé comme traitement du surdosage de magnésium.

Si vous avez utilisé trop de Maalox Antacid, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoison (070/245 245).

Si vous oubliez d'utiliser Maalox Antacid

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez d'utiliser Maalox Antacid

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Affections gastro-intestinales :

Les effets indésirables tels que la constipation, qui est un effet indésirable fréquent de l'hydroxyde d'aluminium, et la diarrhée, qui est un effet indésirable fréquent de l'hydroxyde de magnésium, sont considérablement réduits grâce à l'association des deux substances.
Fréquence indéterminée : douleurs abdominales

Affections du système immunitaire :

Réactions d'hypersensibilité, telles que prurit, urticaire, angio-œdème et réactions anaphylactiques (fréquence indéterminée).

Troubles du métabolisme et de la nutrition :

Très rare : hypermagnésémie. Observée après l'administration prolongée aux patients atteints d'une insuffisance rénale.

Fréquence indéterminée : hypermagnésémie, hyperaluminémie, hypophosphatémie, lors de l'utilisation prolongée ou à doses élevées ou même à des doses normales du produit chez des patients qui suivent un régime pauvre en phosphore ou chez des enfants de moins de 2 ans, pouvant induire une augmentation de la résorption osseuse, une hypercalciurie, une ostéomalacie.

Troubles généraux :

On a rarement rapporté des réactions allergiques.

Une rétention d'aluminium peut donner lieu à une neurotoxicité (maladie cérébrale).

Un traitement prolongé peut donner lieu à un déficit sévère en phosphates, à un ramollissement des os et à une accumulation d'aluminium.

En cas d'insuffisance rénale, une rétention de magnésium peut survenir, ce qui peut induire des troubles cardiovasculaires sur le plan clinique.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via:

Belgique : Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé – Division Vigilance – Boîte Postale 97 – 1000 Bruxelles Madou – Site internet: www.notifieruneffetindesirable.be – E-mail : adr@afmps.be

Luxembourg : Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy – crpv@chru-nancy.fr – Tél. : (+33) 383 656085/87 **OU** Division de la Pharmacie et des Médicaments – Direction de la santé, Luxembourg – pharmacovigilance@ms.etat.lu – Tél. : (+352) 24785592 – Lien pour le formulaire : <https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-medicaments.html>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER MAALOX ANTACID

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

N'utilisez pas ce médicament après la **date de péremption** indiquée sur l'emballage et la plaquette après « EXP ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient Maalox Antacid Sans Sucre Citron 200 mg/400 mg comprimés à croquer

- Les substances actives sont l'oxyde d'aluminium hydraté et l'hydroxyde de magnésium. 1 comprimé à croquer contient 400 mg d'oxyde d'aluminium hydraté (= 200 mg d'oxyde d'aluminium) et 400 mg d'hydroxyde de magnésium.
- Les autres composants sont : solution de sorbitol (E420), maltitol (E965), glycérol (85 %), saccharine sodique, arôme citron vert, talc, stéarate de magnésium, eau purifiée. Voir rubrique 2.

Aspect de Maalox Antacid Sans Sucre Citron 200 mg/400 mg comprimés à croquer et contenu de l'emballage extérieur

Comprimés à croquer blancs à jaunes, ronds, gravés, ayant des bords biseautés et une odeur citron vert.

Boîtes de 20, 40 comprimés à croquer sous plaquette : feuille d'aluminium, compatible avec le PVC ou PVDC ;

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

Sanofi Belgium
Leonardo Da Vincilaan 19
1831 Diegem
Tel.: 02/710.54.00
e-mail : info.belgium@sanofi.com

Fabricant

Sanofi S.p.A.
S.S. 17 km
22 67019 Scoppito (AQ)
Italie

Ou

Sanofi S.p.A.
Viale Europa 11
21040 Origgio
Italie

Mode de délivrance : délivrance libre

Numéro d'autorisation de mise sur le marché
BE411467

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 05/2021